




Nordkystens Dyrehospital




Når du har fået din hund hjem - Vi glemmer jer ikke



Hvad kan jeg forvente efter en indlæggelse?

Din hund har været indlagt hos os, og vi har haft en god samtale om hele forløbet under indlæggelsen og også om tiden efter. Men det kan jo også være, at det har været svært at huske det hele fra samtalen, når man nu sidder og venter på at se sin hund igen! Så derfor har vi udfærdiget denne lille folder, således at du derhjemme i ro og mag kan læse om, hvad du skal være opmærksom på i tiden efter.



Hvad skal jeg være opmærksom på de første dage?

Hvordan din hund har det efter indlæggelsen afhænger af mange faktorer. Således kan nævnes hundens alder, race, vægt og helbredstilstand, ligesom længden og typen af bedøvelsen og operationens/behandlings art har stor betydning.

Selve eftervirkningerne fra bedøvelsen kan være træthed og manglende appetit. Din hund kan også være lidt usikker på benene og vil måske ikke rigtigt ud og gå tur. Øjnene kan hænge lidt, og den første nat kan være lidt urolig, hvor den ikke rigtigt kan finde ro og piber måske en del. Dette vil især være påfaldende, hvis der er foretaget en operation.

I de fleste tilfælde intuberer vi, hvilket vil sige, at vi putter et plastikrør ned i luftvejene for at sikre frie luftveje og give ilt og bedøvelsesmiddel den vej. Dette kan efterfølgende medføre, at der kan være et par dage med lidt tør hoste. Dette er helt normalt. Hvis det varer mere end et par dage, så skal du kontakte os.

Der kan være lidt kvalme og måske enkelte opkastninger den første dag, selvom vi altid giver lidt medicin, som skulle forebygge det.

Du kan også tit opleve, at der går nogle dage, inden der kommer afføring. Dette skyldes, at hunden har været fastende, og det tager derfor lidt tid, inden der er rigtigt gang i systemet igen.

Din hund kan også ligge og ryste lidt. Dette skyldes, at legemstemperaturen falder lidt efter en bedøvelse.

Din hund vil måske også forsøge at slikke/kradse det område, som vi har behandlet/opereret.

I få tilfælde vil der kunne være lidt blod/væske fra et operationssår. Dette er normalt.

Hvis din hund har fået krave på eller bodystocking, så skal du holde det rent ved at vaske det jævnligt.

Du skal også huske at fjerne et eventuelt plaster på benet, som sættes på, efter vi har haft et kateter inde i en blodåre. Pelsen er barberet på dette sted, og den vokser normalt ud på 6-8 uger. Dette gælder også pelsen ved et operationssår. I nogle tilfælde vil de ligge og slikke på de områder, hvor pelsen er fjernet, hvilket kan gøre området irriteret. Dette kan normalt klares med påsmøring af lidt salve, som du kan hente hos os.



Hvad kan jeg selv gøre?

Du skal primært holde øje med din hund og lade hunden få så meget fred og ro som muligt i den første tid.

Dette betyder også, at børn og andre dyr helst skal holdes fra den.

Hvis den er meget urolig og piber en del, så kan du give lidt panodil som supplement til det smertestillende medicin, som hunden har fået hos os, og/eller som du har fået til videre behandling. Nu har du sikkert hørt mange steder fra, at man ikke må give panodil til hunde. Det er rigtigt, hvis man giver for meget, men i en dosis på 10-20 mg/kg 2 gange dagligt, så er det sikkert nok, og det kan redde nattesøvnen for både din hund og dig. Som eksempel må en hund på 10 kg få 100-200 mg panodil 2 gange dagligt.

Du skal holde øje med afgang af afføring og urin, som skal se normalt ud og fungere normalt. Som nævnt kan der gå et par dage, før der er afføring, men dette er helt almindeligt.

Hvis din hund ligger og ryster, så sørg for, at den ligger varmt. Brug gerne et tæppe, og hold en god varme i dens område.



Normalt skal du holde din hund i snor i den første tid efter en indlæggelse. Længden af denne vil afhænge af din hunds operation og tilstand og vil blive bestemt af din dyrlæge.

Du skal også holde øje med operationssår. Normalt vil du ikke kunne se trådene, da vi i langt de fleste tilfælde lægger trådene under huden, således at du kun ser en smal streg i huden. I nogle tilfælde kan du se en lille mørk "prik" i begge ender. Dette er der, hvor tråden starter og slutter. I nogle tilfælde kan hunde efter et stykke tid "afstøde" tråden, hvilket vil vise sig med en eller flere områder, hvor det væsker lidt, og hvor man så kan se et lille stykke af tråden. Dette er ikke farligt, og klares normalt let med at fjerne tråden. Og du skal normalt heller ikke være nervøs, hvis der kommer lidt åbning i selve såret. Der er flere lag nedeunder, hvor der er lagt andre tråde.



Hvad må jeg give at spise?

Normalt kan du give det normale foder, som du har derhjemme, med mindre vi har anbefalet noget andet. Du kan med fordel give små portioner de første dage.

Hvis der er foretaget tandbehandling, bør du give opblødt foder/dåsemad de første 4-5 dage. Dette gælder især, hvis der er foretaget tandudtrækninger.



De fleste af vores patienter bliver tilbudt a/d vådfoder fra Hill's efter operation, da det indeholder en øget mængde af specielle proteiner til at fremme sårheling og styrke immunforsvaret.

Hvad med genoptræning og anden behandling?

Hvis din hund har fået konstateret eller er blevet opereret for en knogle- eller ledlidelse, så kan der blive tale om genoptræning i form af fysioterapi samt laserbehandling. Dette aftaler du direkte med os.

I andre tilfælde kan der også blive tale om yderligere medicinering udover smertestillende. Dette kunne være, hvis der bliver konstateret betændelse, organsygdomme samt hormonelle sygdomme.

En lang række af sygdomme vil også medføre en ændring af foderet. Dette vil vi også gennemgå grundigt sammen med dig.

Vi vil i samarbejde med dig sørge for den bedste løsning, således at du og din hund kan få en lang og god tid sammen!



Hvornår skal jeg kontakte jer?

Normalt vil vi have aftalt et tidspunkt for kontrol efter en periode på 1-2 uger.

Og ellers skal du kontakte os i følgende tilfælde:

- Der opstår feber
- Der kommer vedvarende opkastninger og/eller diarre
- Der er blødning, hævelse, åbning eller betændelse fra operationssår

Fortsættes på næste side ►

- Der er problemer med vejrtrækningen
- Din hund ikke vil rejse sig eller er unaturligt sløv
- Din hund ikke vil æde eller drikke efter 24 timer
- Der er vedvarende stærke smerter
- Og ellers hvis du er i tvivl om noget!

Hvis det er uden for normal åbningstid, så må du ringe til vagthavende dyrlæge.

Hvis du har vores VetPlan aftale, så kan du altid få fat i en af vores dyrlæger alle dage til kl. 21. Også weekender og helligdage. Denne ordning er helt unik for vores VetPlan på Nordkystens Dyrehospital.

Hvor stor er risikoen for, at der kan opstå komplikationer på grund af bedøvelsen?

I et større studie var tallene for dødsfald under bedøvelse på ca. 0,07 %. Det vil sige, at 1 ud af 1400 hunde og katte dør uventet under bedøvelse.

Denne undersøgelse involverer mange typer dyrlægepraksis, hvor dødstallene er mindre på steder, hvor der gøres ekstra meget for sikkerheden og overvågning.

På Nordkystens Dyrehospital har vi siden 2011, hvor vi har haft mere end 12.000 bedøvelser, kun haft 2 uventede dødsfald, dermed ligger vi på ca. 1 dødsfald ud af 6000, altså mere end 4 gange bedre end gennemsnittet.



Vi håber, at vi med denne folder kan give dig en stor grad af tryghed og sikkerhed. Informationen i folderen skal ses som en lille del af vores daglige arbejde med at give dig og dit kæledyr den tid, nærvær og omsorg, som I har behov for.

Du skal vide, at vi på Nordkystens Dyrehospital altid vil hjælpe dig, når du har brug for os. Også hvis du er bekymret eller utryg ved dit dyrs tilstand.

Vi skulle gerne i fællesskab sørge for at dit kæledyr får et godt og langt liv til glæde for dig og dit dyr.

Husk at du kan se alle vores informationsfoldere på vores hjemmeside: www.nordkystensdyrehospital.dk

- Alle os på Nordkystens Dyrehospital



 **Nordkystens
Dyrehospital**

 VetFamily

- En del af familien